



¡Vacúnate contra el sarampión!

¡Una vacuna para 3 enfermedades!

La vacuna contra el sarampión es parte de la vacuna MMR o triple viral



Dos dosis



Primera dosis

12 meses y más



Segunda dosis

4 a 6 años




Brotes o viajes

Los niños de **6-11 meses** que viven en zonas con brotes o que necesitan viajar fuera del país **pueden recibir una dosis** al menos 2 semanas antes de una posible exposición

Vacunación de rescate

Niños **NO vacunados de 16 meses** en adelante necesitan **2 dosis**, con un mínimo de 4 semanas de diferencia entre ellas



Adultos

Adultos nacidos antes de 1957 y que **NO** han recibido ninguna dosis de la vacuna MMR y adultos que nacieron después de 1957 **deben recibir al menos 1 dosis**



Si tiene dudas, consulte con un médico



Mujeres embarazadas

No se deben poner esta vacuna



Trabajadores de la salud y voluntarios

Todos los trabajadores de la salud y voluntarios en cualquier tipo de entorno de salud, **1 dosis adicional**

Otros adultos

Deben recibir **2 dosis de la vacuna triple viral (MMR)** con al menos 28 días de diferencia, los adultos que:

- Trabajen o vayan a la escuela
- Estén en contacto cercano con personas con sistemas inmunitarios comprometidos
- Viajen internacionalmente, incluyendo cruceros
- Viven con VIH sin inmunosupresión severa

